



- [GOAL Events](#)
- [Advocate Magazine](#)
- [Aquademia Podcast](#)
- [Blog](#)
- [Contact](#)

-
-
-
-
-

- [Log In](#)



- [About](#)
 - [Who We Are](#)
 - [Our History](#)
 - [Our Team](#)
 - [Sustainable Development Goals](#)
 - [Careers](#)
- [Membership](#)
 - [Overview](#)
 - [Our Members](#)
 - [Corporate Membership](#)
- [Resources](#)
- [Certification](#)
 - [Best Aquaculture Practices](#)
 - [Best Seafood Practices](#)

[Log In](#)

- [About](#)
 - [Who We Are](#)
 - [Our History](#)
 - [Our Team](#)
 - [Sustainable Development Goals](#)
 - [Careers](#)
- [Membership](#)
 - [Overview](#)
 - [Our Members](#)
 - [Corporate Membership](#)
- [Resources](#)
- [Certification](#)
 - [Best Aquaculture Practices](#)
 - [Best Seafood Practices](#)
- [GOAL Events](#)
- [Advocate Magazine](#)

- [Aquademia Podcast](#)
- [Blog](#)
- [Contact](#)



Health & Welfare
Health & Welfare

La enfermedad emergente epiteliocystis en espáridos mediterráneos es causada por bacterias novedosas

[Responsible Seafood Advocate logo](#)

2 March 2016 Dr. Helena Seth-Smith Dr. Pantelis Katharios Prof. Lloyd Vaughan



Nueva investigación fundamental para el diagnóstico de la enfermedad y el seguimiento de las epidemias




Figura 1A: Branquias de dorada infectada, visualizadas usando un microscopio de disección. Las manchas blancas son epiteliocistes. 1B: Larva entera infectada de sargo picudo, 28 dph, imagen de campo brillante. Los quistes son fácilmente evidentes en las aletas y la piel. Barras de escala 1 mm.

La epiteliocystis es una infección emergente en la dorada cultivada, y también es letal en los cultivos de mesocosmos de larvas de sargo picudo. Dos estudios de esta enfermedad en sitios en Grecia y Creta han caracterizado los quistes branquiales y de la piel en más detalle. El análisis genético muestra que las infecciones en estas especies de peces son causadas por bacterias diferentes y nuevas, y la secuenciación del genoma está aportando conocimientos sobre la diversidad de estos patógenos y su estilo de vida. Esta investigación es fundamental para el diagnóstico de agentes que causan la epiteliocystis, y ayudará a rastrear las epidemias de la enfermedad.

Epiteliocystis en espáridos

La epiteliocystis es una enfermedad de peces de agua dulce y salada, causando quistes principalmente en las branquias y epitelios de la piel de juveniles y adultos. Estudios anteriores han demostrado que la mayoría de las infecciones involucran bacterias relacionadas con *Clamidia*, lo que significa que la mayoría de los estudios sólo buscan estas. Sin embargo, en los últimos años, nuevos descubrimientos han demostrado que otras bacterias, altamente no relacionadas también se encuentran causando epiteliocystis.

Hasta la fecha hay muy poca información acerca de esta enfermedad en especies de peces acuícolas de alto valor criados en el Mediterráneo. Algunos estudios realizados en la década de 1970 describen la enfermedad en la dorada, pero sin ninguna información sobre cuál es la causa. Dos estudios nuevos se han enfocado en esta falta de información, mirando la epiteliocystis en dorada cultivada en Grecia, y en un cultivo de mesocosmo de larvas de sargo picudo en Creta.

Se ha encontrado que la epiteliocystis es una enfermedad emergente en la dorada. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 15 años dentro de una empresa acuícola comercial, la mortalidad atribuida a epiteliocystis ha aumentado de 0-2 por ciento (como el porcentaje de todos los peces), con una tendencia al alza en curso. Esto corrobora muchos cuentos anecdóticos de los números de casos de epiteliocystis que están aumentando, que hasta ahora, por desgracia, no se registran. Nuestro estudio investigó cohortes de peces infectados en 3 sitios desde noviembre 2012 hasta junio 2013, algunos de los cuales fueron muestreados durante los brotes de epiteliocystis. Hospederos que son capaces de eliminar la infección no parecen sufrir de infecciones recurrentes.

El sargo picudo se está proponiendo como una nueva, deliciosa especie candidata para traer a la acuicultura. Usando métodos de mesocosmos en los que las larvas se cultivan en tanques de agua de mar suplementada, hemos encontrado altos índices de mortalidad (hasta un 25 por ciento) como resultado de epiteliocystis. Los juveniles que sobrevivieron fueron capaces de despejar la enfermedad y fueron trasladados a tanques de engorde.

Diagnosis of epiteliocystis

Los peces sacrificados se pueden diagnosticar con el microscopio óptico (Figura 1A y 1B) por los grandes quistes visibles en las branquias o en la piel de las larvas.

La tinción de secciones de peces infectados utilizando hematoxilina y eosina o con azul de metileno / azure II / fucsina básica también puede ayudar a los patólogos con el diagnóstico (Figura 2A y 2B). En ambos casos hemos visto quistes que son basófilos, con hasta 100µm de diámetro, rodeados de membranas gruesas eosinófilas, con diversos grados de hiperplasia epitelial. En dorada, las laminillas branquiales secundarias pueden estar redondeadas y fundidas, haciendo que el área de superficie de las branquias se reduzca de manera significativa, y una inflamación leve es aparente. Los quistes dentro del sargo picudo tienen una apariencia más granular.




Figura 2A: Sección branquial de dorada teñida con hematoxilina y eosina. 2B: Sección de cabeza de sargo picudo teñida con azul de metileno / azure II / fucsina básica. Barra de escala A. 100 μm , B. 200 μm .

Imágenes detalladas de epiteliocistes

La determinación de las bacterias involucradas en estas infecciones se realizó por secuenciación de un gen de firma, el gen ribosomal 16S ARN, que se utiliza para identificar especies bacterianas. Una vez que se conoce la secuencia de este gen, sondas fueron diseñadas contra las secuencias específicas y utilizadas para confirmar que estas bacterias son de hecho las responsables de las infecciones, ya que residen en grandes cantidades dentro de los quistes (Figura 3A y 3B).




Figura 3. Secciones con los respectivos genes 16S ARNr bacterianos marcados con fluorescencia para mostrar el patógeno específico presente en los epiteliocistes. A: Branquia de dorada. B: Sección de sargo picudo. Barra de escala A. 50 μm , B. 10 μm .

Como estas bacterias sólo se han encontrado hasta ahora en el pez hospedero, y no han sido cultivadas en el laboratorio, los métodos para su investigación son limitados. Por lo tanto, microscopía electrónica de transmisión (TEM) de alta resolución se utilizó para obtener más de una visión del entorno del quiste, y mostró dos tipos muy diferentes de bacterias, ninguna de las cuales se ve como el tipo familiar de quiste de clamidias (Figura 4A y 4B).

Identificación de nuevos patógenos de epiteliocystis

Usando la información de secuencia, las bacterias responsables de los grandes quistes han sido identificadas como nuevos patógenos de peces. Una nueva familia de bacterias, que hemos denominado *Ichthyocystis*, se encuentra dentro de la dorada, y una especie del grupo de bacterias marinas *Endozoicomonas* ampliamente distribuida se encuentra en sargo picudo. Estas no están en absoluto relacionadas con patógenos de clamidia previamente encontradas en epiteliocystis: las beta-proteobacterias *Ichthyocystis* están relacionadas con bacterias *Pseudomonas* y *Vibrio*, y la familia *Endozoicomonas* pertenece a las gamma-proteobacterias, más estrechamente relacionadas con los agentes causantes de la meningitis o la melioidosis.

Trabajo adicional en los genomas de estas bacterias mostró que las bacterias *Ichthyocystis* son muy diversas, con muchas cepas circulando y co-infectando hospederos. Están son claramente bacterias intracelulares, y por lo tanto son completamente dependientes de los peces como hospederos. Las bacterias *Endozoicomonas* están relacionadas con simbiontes conocidos de diversos hospederos marinos, pero parecen estar evolucionando a un nicho más específico, tal vez como patógenos dedicados de peces.

La aparición de estos nuevos agentes de epiteliocystis debería ser un motivo de preocupación para los involucrados en la acuicultura y el bienestar de los peces. Estas bacterias ahora se pueden añadir a las muchas especies de *Chlamydiae* que se sabe causan epiteliocystis, y que también se encontraron en las branquias de dorada, aunque a

niveles más bajos. Estos estudios ponen de relieve la necesidad de la comunidad de utilizar herramientas más avanzadas para supervisar y diagnosticar esta enfermedad.

Figura 4. Micrografías de Transmisión Electrónica. A: Quiste de dorada. B: Quiste de sargo picudo. Barra de escala A. 10 μ m, B. 1 μ m.

Perspectivas

Este trabajo muestra que nuevas infecciones de peces están surgiendo todo el tiempo, resultando en patologías reconocidas, pero causadas por agentes bacterianos variados. La investigación detallada debe continuar, especialmente porque peces de alto valor están involucrados y las incidencias parecen estar en aumento. Se necesita más investigación sobre los peces infectados de sitios más lejanos para investigar cuan extendidas y diversas están estas bacterias. Un registro más detallado de las enfermedades y el intercambio de datos también se requieren para detallar el impacto que estas infecciones están teniendo en la industria acuícola.

Estos estudios son un primer paso hacia la comprensión de las bacterias implicadas en epiteliocystis, y pueden conducir a un diagnóstico más rápido y preciso. Esto es necesario para determinar si las mejoras en la cría de animales pueden reducir las tasas de infección y mejorar la salud de los peces, y si vacunas se pueden desarrollar en el futuro.

Notas de autor:

Si está interesado en ayudar nuestra investigación adicional con datos o muestras, favor contacte al Dr. Pantelis Katharios, katharios@hcmr.gr. Todas las imágenes reimpresas con permiso de Macmillan Publishers Ltd: Scientific Reports, doi: 10.1038/srep17609 (2015) and The ISME Journal, doi: 10.1038/ismej.2015.223 (2015).

Publicaciones describiendo este trabajo:

Katharios, P. et al. "Environmental marine pathogens: striking genomic and morphological features of a novel *Endozoicomonas* sp. causing disease in sharpsnout seabream". Scientific Reports (2015), doi: 10.1038/srep17609

Seth-Smith, H.M.B. et al. "Emerging pathogens of gilthead seabream: characterisation and genomic analysis of novel intracellular β —proteobacteria." The ISME Journal (2015), doi: 10.1038/ismej.2015.223

Authors



Dr. Helena Seth-Smith

Functional Genomics Center Zürich
University of Zürich,
Winterthurerstrasse 190 8057
Zürich, Switzerland

[107,117,46,103,114,111,46,104,116,105,109,115,45,104,116,101,115,64,115,115,104]



Dr. Pantelis Katharios

Institute of Marine Biology
Biotechnology and Aquaculture
Hellenic Center for Marine Research
Heraklion, Crete, Greece

[114,103,46,114,109,99,104,64,115,111,105,114,97,104,116,97,107]



Prof. Lloyd Vaughan

Institute for Veterinary Pathology
Vetsuisse Faculty,
University of Zürich,
Winterthurerstrasse 268, CH-8057
Zürich, Switzerland

[104,99,46,104,122,117,46,104,116,97,112,116,101,118,64,108,110,97,104,103,117,97,118]

Share

- [✉ Share via Email](#)
- [🐦 Share on Twitter](#)
- [f Share on Facebook](#)
- [in Share on LinkedIn](#)

Tagged With

[bacterias novedosas dorada](#) [Artículos en Español](#) [Helena Seth-Smith](#) [Pantelis Katharios](#) [Lloyd Vaughan](#)
[epiteliocystis](#)

Related Posts

Health & Welfare

[El uso juicioso de fósforo es clave para la salud de los peces cultivados](#)

El fósforo en la dieta es esencial para el crecimiento y desarrollo saludable del esqueleto de los peces cultivados. La salud de los peces, la disponibilidad limitada y las preocupaciones ambientales todas instan a la acuicultura moderna a manejar los recursos de fósforo con prudencia y de manera sostenible.

Health & Welfare

[Emerging epiteliocystis disease in Mediterranean sparids caused by novel bacteria](#)

Epitheliocystis is an emerging infection among farmed gilthead seabream and is also lethal in mesocosm cultures of sharpsnout seabream larvae. Two studies of this disease at sites in Greece and Crete have characterized the gill and skin cysts in more detail.

About The Advocate

The Responsible Seafood Advocate supports the Global Seafood Alliance's (GSA) mission to advance responsible seafood practices through education, advocacy and third-party assurances.

[Learn More](#)

Search Responsible Seafood Advocate



Advertising Opportunities

[2022 Media & Events Kit](#)

Categories

[Aquafeeds](#) > [Health & Welfare](#) [Health & Welfare](#) > [From Our Sponsors](#) > [Innovation & Investment](#) > [Intelligence](#) > [Responsibility](#) > [Fisheries](#) > [Artículos en Español](#) >

Don't Miss an Article

Featured

- [Health & Welfare](#) [An update on vibriosis, the major bacterial disease shrimp farmers face](#)
- [Intelligence](#) [A seat at the table: Fed By Blue team says aquaculture needs a stronger voice](#)
- [Responsibility](#) [Quantifying habitat provisioning at macroalgae cultivation locations](#)

Popular Tags

All Tags



Recent

- [Fisheries Second Test: Another filler for the fisheries category](#)
- [Fisheries Test: This is filler for the fisheries Category](#)
- [Aquafeeds Test Article](#)
- [Responsibility Study: Climate change will shuffle marine ecosystems in unexpected ways as ocean temperature warms](#)
- [Health & Welfare Indian shrimp researchers earn a patent for WSSV diagnostic tool](#)



- [About](#)
- [Membership](#)
- [Resources](#)
- [Best Aquaculture Practices \(BAP\)](#)
- [Best Seafood Practices \(BSP\)](#)
- [GOAL Events](#)
- [Advocate Magazine](#)
- [Aquademia Podcast](#)
- [Blog](#)
- [Contact](#)

Stay up to date with GSA

- 
- 
- 
- 
- 

Copyright © 2024 Global Seafood Alliance

All rights reserved.

[Privacy](#)

[Terms of Use](#)

[Glossary](#)